

第一外科 【末梢】

レジメン名称：胃癌 ニボルマブ療法

レジメン説明：2017/10/25承認

2018/9/12 ニボルマブ240mg/bodyへ

2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	240mg		240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：胃癌 ニボルマブ療法 点滴静注： *点滴時間 60分で 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名：胃癌 ニボルマブ療法 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：胃癌 ニボルマブ療法 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用すること