

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : Standard CDDP + 5-FU 【イメド[®]内服】

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2018/7/20 フロセド[®]「テハ」→「武田テハ」の変更に伴い修正
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m2		73.5mg/m2
06	点滴静注	(化)5-FU注※	700mg/m2		735mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
01	点滴静注	ソルテ [®] Δ3A 輸液500mL 療法名:Standard CDDP + 5-FU 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴速度 80m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		4回	2回	4回				
02	点滴静注	大塚糖液 5% 500mL ソフトバ [®] ック [®] 大塚食塩注10% 20mL 療法名:Standard CDDP + 5-FU 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL			2回					
03	点滴静注	デキサ [®] 注射液(デカト [®] ロン後発)※ アロキ [®] 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Standard CDDP + 5-FU 【イメド [®] 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL			1回					
04	静注(ワンショット)	フロセド [®] (テシックス後発)注20mg「武田テハ」 2mL 生理食塩液 20mL プラアンプル 療法名:Standard CDDP + 5-FU 【イメド [®] 内服】 静脈内注射 (ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg 20mL			1回					
05	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ック [®] 「テルモ」 療法名:Standard CDDP + 5-FU 【イメド [®] 内服】	0mg 300mL			1回					
	<次ページあり>										

第一外科 【末梢】

レジメン名称：Standard CDDP + 5-FU 【イマト内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
		点滴静注： *点滴時間 2時間で 投与経路：末梢サブルート1									
06	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL (化)5-FU注※ 療法名：Standard CDDP + 5-FU 【イマト内服】 点滴静注： *点滴時間 24時間で 投与経路：末梢サブルート1	500mL 0mg			1回	1回	1回	1回	1回	
07	点滴静注	テキアト注射液(テカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名：Standard CDDP + 5-FU 【イマト内服】 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	6.6mg 100mL				1回	1回	1回		
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：Standard CDDP + 5-FU 【イマト内服】 点滴静注： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL					1回	1回	1回	

RP	オーダーコメント
03	CDDPの投与前30分
04	CDDPの投与前
08	ルートキープ