

インターバル日数 : 7 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : Low dose FP療法(連日投与)病棟用

レジメン説明 : 2015移行により生成  
 2018/7/10 ガインDをバック製剤に変更  
 2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正  
 2019/3/18 制吐剤グラニセトロンバックを連日組み込み

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)シス <sup>ラ</sup> チン点滴静注「マルコ」※	5mg/m2		25mg/m2
04	点滴静注	(化)5-FU注※	350mg/m2		750mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Low dose FP療法(連日投与)病棟用 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1
02	点滴静注	グラニセトロン点滴静注バック 3mg/100mL「NK」 療法名:Low dose FP療法(連日投与)病棟用 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	3mg		投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2
03	点滴静注	(化)シス <sup>ラ</sup> チン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:Low dose FP療法(連日投与)病棟用 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3
04	点滴静注	(化)5-FU注※ ガインD輸液 500mL バック 療法名:Low dose FP療法(連日投与)病棟用 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 4

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ