

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/12/4CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	100mg/m2		105mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL フラボトル 療法名:Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	グレースロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL 療法名:Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 20mg		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:Weekly Paclitaxel 食道癌 6投2休 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用