

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 【q4w】食道癌 ニボルマブ療法

レジメン説明 : 2020/9/30承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称          | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値   |
|----|------|---------------|----------|-----|-------|
| 03 | 点滴静注 | (化)オプジーボ点滴静注※ | 480mg    |     | 480mg |

| RP | 手技   | 薬剤名称  | 用量/単位        | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|---|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH<br>療法名: 【q4w】食道癌 ニボルマブ療法<br>点滴静注:<br>*点滴時間 60分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1                  | 100mL        |       | 投与順 1 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴静注 | ボラミン注 5mg 1ml<br>生理食塩液 50mL プラボットル<br>療法名: 【q4w】食道癌 ニボルマブ療法<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 5mg<br>50mL  |       | 投与順 2 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴静注 | (化)オプジーボ点滴静注※<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名: 【q4w】食道癌 ニボルマブ療法<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1  | 0mg<br>100mL |       | 投与順 3 |  |  |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント                      |
|----|-------------------------------|
| 01 | ルートキープ                        |
| 03 | 0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用すること |