



## 第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFIRI (CPT-11&amp;5Fu/LV)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3			
05	中心静脈注射	(化)レボホリナート点滴静注用※「ヤルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFIRI (CPT-11&5Fu/LV) 中心静脈注射: *点滴時間 120分で 投与経路:CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 5					
06	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 大塚糖液 5% 50mL プラボトル 療法名:FOLFIRI (CPT-11&5Fu/LV) 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 50mL		投与順 6					
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:FOLFIRI (CPT-11&5Fu/LV) 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 150mL		投与順 7					
08	ロック	ロック用生食注シリンジ 10mL「オツカ」 療法名:FOLFIRI (CPT-11&5Fu/LV) ロック:	10mL		1回		1回			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	トポテシン投与30分前に
04	レボホリナートと同時投与
05	トポテシンと同時投与
07	全量150mL。インフューザーポンプ使用。