

第一外科 【CV】 レジメン名称： 進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV)

レジメン説明： 2015移行により生成
 2017年12月28日診療科より依頼有りホアプ^レビ^レント追加 (デキマダ^ン半量)
 2018/12/4 CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件： <S-1>

★80mg/m²/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休業

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルブ ^ラ ット後発)点滴静注液「NK」※	130mg/m ²		136.5mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	大塚糖液 5% 100mL プラボ ^{トル} 療法名：進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	プロイマ ^ト 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴時間 30分で 投与経路：CVサブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	デキマ ^ト 注射液(デ ^カ ト ^ン 後発)※ ホ ^ラ ミン注 5mg 1ml ア ^ロ キ ^ン 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴時間 30分で 投与経路：CVサブルート1	3.3mg 5mg 1V 100mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルブ ^ラ ット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボ ^{トル} 療法名：進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴時間 120分で 投与経路：CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	フラッシュ <次ページあり>	ロ ^ク 用 生食注 ^シ ン ^ジ 10mL 「ホ ^ツ カ」	10mL		2回						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : 進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名:進行・再発大腸癌 SOX (130) 1外科(CV) フラッシュ:									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	オキサリプラチン投与1時間以上前に投与開始