

第一外科 【CV】 レジメン名称：大腸癌術後 SOX (100) 1外科(CV)

レジメン説明：2015移行により生成  
 2017年12月28日診療科より依頼有りホアプ<sup>レ</sup>カト追加 (デキマゾン半量)  
 2018/12/4 CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件： &lt;S-1&gt;

★80mg/m<sup>2</sup>/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用：体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルプラット後発)点滴静注液「NK」※	100mg/m <sup>2</sup>		105mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名：大腸癌術後 SOX (100) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	プロイマド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：大腸癌術後 SOX (100) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴時間 30分で 投与経路：CVサブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	デキマゾン注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml アロキニ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名：大腸癌術後 SOX (100) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴時間 30分で 投与経路：CVサブルート1	3.3mg 5mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルプラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名：大腸癌術後 SOX (100) 1外科(CV) 中心静脈注射： *点滴時間 120分で 投与経路：CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	フラッシュ <次ページあり>	ロック用 生食注シリンジ 10mL 「オツカ」	10mL		2回						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : 大腸癌術後 SOX (100) 1外科 (CV)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名:大腸癌術後 SOX (100) 1外科 (CV) フラッシュ:									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	オキサリプラチン投与1時間以上前に投与開始