



第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFOXIRI + Bev 【ホスアプ®レピ®タント】

| RP | 手技     | 薬剤名称   | 用量/単位        | 処方1回量 | Day1  | Day2 | Day3 |  |  |  |  |
|----|--------|--|--------------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 05 | 中心静脈注射 | (化)トポテシ点滴静注※<br>大塚糖液 5% 250mL フラボトル<br>療法名:FOLFOXIRI + Bev 【ホスアプ®レピ®タント】<br>中心静脈注射:<br>*点滴時間 1時間で<br>投与経路:C Vサブルート1                    | 0mg<br>250mL |       | 投与順 5 |      |      |  |  |  |  |
| 06 | 中心静脈注射 | (化)オキサリプラチン(エルプラット後発)点滴静注液「NK」※<br>大塚糖液 5% 250mL フラボトル<br>療法名:FOLFOXIRI + Bev 【ホスアプ®レピ®タント】<br>中心静脈注射:<br>*点滴時間 2時間で<br>投与経路:C Vサブルート1 | 0mg<br>250mL |       | 投与順 6 |      |      |  |  |  |  |
| 07 | 中心静脈注射 | (化)レボホリナート点滴静注用※「ヤクルト」<br>大塚糖液 5% 250mL フラボトル<br>療法名:FOLFOXIRI + Bev 【ホスアプ®レピ®タント】<br>中心静脈注射:<br>*点滴時間 2時間で<br>投与経路:C Vサブルート2          | 0mg<br>250mL |       | 投与順 7 |      |      |  |  |  |  |
| 08 | 中心静脈注射 | (化)5-FU注※<br>生理食塩液 50mL フラボトル<br>療法名:FOLFOXIRI + Bev 【ホスアプ®レピ®タント】<br>中心静脈注射:<br>*点滴時間 48時間で<br>投与経路:C Vポート                            | 0mg<br>150mL |       | 投与順 8 |      |      |  |  |  |  |
| 09 | ロック    | ロック用生食注シリンジ 10mL 「オーツカ」<br>療法名:FOLFOXIRI + Bev 【ホスアプ®レピ®タント】<br>ロック:   | 10mL         |       | 1回    |      | 1回   |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント                         |
|----|----------------------------------|
| 01 | ルートキープ                           |
| 04 | 初回90分、忍容性良ければ2回目60分、それ以降30分まで短縮可 |
| 06 | レボホリナートと同時投与                     |
| 07 | オキサリプラチンと同時投与                    |
| 08 | 全量150mL。インフューザーポンプ使用             |