

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : Avastin 【5mg/kg】 + mFOLFOX6

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3			
		投与経路:CVサブルート1								
05	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:Avastin 【5mg/kg】 + mFOLFOX6 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 5					
06	中心静脈注射	(化)レボホリナト点滴静注用※「ヤクルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:Avastin 【5mg/kg】 + mFOLFOX6 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 6					
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Avastin 【5mg/kg】 + mFOLFOX6 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 50mL		投与順 7					
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Avastin 【5mg/kg】 + mFOLFOX6 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路:CVルートメイン1	0mg 150mL		投与順 8					
09	ロック	ロック用生食注シリンジ 10mL「ホウカ」 療法名:Avastin 【5mg/kg】 + mFOLFOX6 ロック:	1本		1回		1回			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	アバスタチン投与30分前に
04	初回90分、忍容性良ければ2回目60分、それ以降30分まで短縮可
05	レボホリナトと同時投与
06	オキサリプラチンと同時投与
08	全量150mL。インフューザーポンプ使用