

第一外科 【CV】 レジメン名称 : SOX + BEV (CV)

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017年12月28日診療科より依頼有りホアア°レ°タト追加 (テ°キマタ°ン半量)

適用条件 : <S-1>  
★80mg/m2/日を1日2回に分けて服用  
★2週投与→1週休薬

除外条件 :  
体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184  
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	中心静脈注射	(化)アパ°スチン点滴静注用※	7.5mg/kg		7.88mg/kg
05	中心静脈注射	(化)オキサリ°ラチン(エル°ラット後発)点滴静注液「NK」※	130mg/m2		136.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	中心静脈注射	大塚糖液 5% 100mL フ°ラホ°トル 療法名:SOX + BEV (CV) 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	中心静脈注射	プロイメント°点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:SOX + BEV (CV) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	中心静脈注射	テ°キマ°ト注射液(テ°カ°ト°ン後発)※ ホ°ラミン注 5mg 1ml ア°キ°シ°静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:SOX + BEV (CV) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	3.3mg 5mg 1V 100mL		投与順 3							
04	中心静脈注射	(化)アパ°スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:SOX + BEV (CV) 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 100mL		投与順 4							
05	中心静脈注射 <次ページあり>	(化)オキサリ°ラチン(エル°ラット後発)点滴静注液「NK」※	0mg		投与順 5							

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : SOX + BEV (CV)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:SOX + BEV (CV) 中心静脈注射: *点滴時間 120分で 投与経路:CVサブルート1	250mL								
06	フラッシュ	ロック用生食注射液 10mL 「ホツカ」 療法名:SOX + BEV (CV) フラッシュ:	10mL		2回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アパスチン投与1時間以上前に投与開始
04	初回90分。忍容性が良ければ2回目60分、それ以降30分へ短縮可