

第一外科 【CV】

レジメン名称 : S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV) 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路: C Vルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路: C Vサブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	デキスト注射液(デカトロン後発)※ アロキ静注0.75mg 5mL ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路: C Vサブルート1	4.95mg 0.75mg 5mg 100mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)アバシチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV) 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路: C Vサブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	中心静脈注射	(化)トボテン点滴静注※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV) 中心静脈注射: *点滴時間 90分で 投与経路: C Vサブルート1	0mg 250mL		投与順 5						
06	フラッシュ	ロック用 生食注射液 10mL 「オツカ」 療法名:S-1/CPT-11/BEV (IRIS + BEV) 療法(CV) フラッシュ:	10mL		2回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	初回90分、忍容性が良ければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可