

第一外科 【CV】

レジメン名称 : サルトラップ + FOLFIRI

レジメン説明 : 2017/6/27承認  
2018/7/2ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	中心静脈注射	(化)サルトラップ 点滴静注※	4mg/kg		4.2mg/kg
05	中心静脈注射	(化)トプ テン点滴静注※	150mg/m2		157.5mg/m2
06	中心静脈注射	(化)レボ ホリナト点滴静注用※「ヤクルト」	200mg/m2		210mg/m2
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※	2400mg/m2		2520mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:サルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	プロイメント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:サルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1mL アロキニ静注0.75mg 5mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:サルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路:CVサブルート1 全開で滴下	3.3mg 5mg 1V 50mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)サルトラップ 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:サルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で  <次ページあり>	0mg 100mL		投与順 4						

第一外科 【CV】

レジメン名称 : ザルトラップ + FOLFIRI

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3			
		投与経路: CVサブルート1								
05	中心静脈注射	(化)トポ テシン点滴静注※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名: ザルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路: CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 5					
06	中心静脈注射	(化)レボ ホリナト点滴静注用※「ヤクルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名: ザルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路: CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 6					
07	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: ザルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 5分で 投与経路: CVサブルート1	0mg 50mL		投与順 7					
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: ザルトラップ + FOLFIRI 中心静脈注射: *点滴時間 46時間で 投与経路: CVルートメイン1	0mg 150mL		投与順 8					
09	フラッシュ	ロック用生食注シリンジ 10mL 「オツカ」 療法名: ザルトラップ + FOLFIRI フラッシュ:	1本		1回		1回			

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	ザルトラップ投与30分前
04	0.2 μmのフィルター使用 0.6~8mg/mLの濃度になるよう調製
05	レボホリナトと同時投与
06	トポテシンと同時投与
08	全量150mL。インフューザーポンプ使用