

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 12クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFOXIRI + CET(1コース目)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
05	中心静脈注射	(化)トポ テン点滴静注※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 5						
06	中心静脈注射	(化)オキサリプラチン(エルプラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 6						
07	中心静脈注射	(化)レボ カリナト点滴静注用※「ヤルト」 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート2	0mg 250mL		投与順 7						
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 48時間で 投与経路:CVポート	0mg 150mL		投与順 8						
09	ロック	ロック用生食注シリンジ 10mL「オツカ」 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) ロック:	10mL		1回		1回				
10	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL								
11	中心静脈注射	ポラミン注 5mg 1ml デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で	5mg 3.3mg 100mL								
	<次ページあり>										

第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFOXIRI + CET(1コース目)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート2	250mL								
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 48時間で 投与経路:CVポート	0mg 150mL								
09	ロック	ロック用 生食注シリンジ 10mL 「オツカ」 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) ロック:	10mL		1回						
10	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
11	中心静脈注射	ポラミン注 5mg 1ml デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 3.3mg 100mL		投与順 2						
12	中心静脈注射	(化)アヒバックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET(1コース目) 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	全量500mL
06	レボホリナートと同時投与
07	オキサリプラチンと同時投与
08	全量150mL

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

印刷日時 : 2020-06-04 14:14:28

最大クール数 : 12クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFOXIRI + CET(1コース目)

RP	オーダーコメント
10	インフューザーポンプ使用
12	ルートキープ 全量250mL

第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFOXIRI + CET (2コース目以降)

レジメン説明 : 2019年12月26日承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	中心静脈注射	(化)ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2
05	中心静脈注射	(化)トボ`テシ点滴静注※	150mg/m2		157.5mg/m2
06	中心静脈注射	(化)キカリ`ラチン(エル`ラット後発)点滴静注液「NK」※	85mg/m2		89.25mg/m2
07	中心静脈注射	(化)レボ`ホナト点滴静注用※「ヤルト」	200mg/m2		210mg/m2
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※	2400mg/m2		2520mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	中心静脈注射	生理食塩液 250mL プ`ラボ`トル 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	プロ`イムト`点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	中心静脈注射	ホ`ラミン注 5mg 1ml テ`キサト注射液(テ`カト`ロン後発)※ ア`ロキ`ン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 3.3mg 0.75mg 100mL		投与順 3						
04	中心静脈注射	(化)ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プ`ラボ`トル 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 60分で 投与経路:CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	中心静脈注射 <次ページあり>	(化)トボ`テシ点滴静注※	0mg		投与順 5						

第一外科 【CV】

レジメン名称 : FOLFOXIRI + CET (2コース目以降)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVサブルート2	250mL								
08	中心静脈注射	(化)5-FU注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 48時間で 投与経路:CVポート	0mg 150mL								
09	ロック	ロック用 生食注シリンジ 10mL 「オツカ」 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) ロック:	10mL		1回						
10	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
11	中心静脈注射	ポラミン注 5mg 1ml デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:FOLFOXIRI + CET (2コース目以降) 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	5mg 3.3mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	全量250mL
06	レボホリナートと同時投与
07	オキサリプラチンと同時投与
08	全量150mL インフューザーポンプ使用
10	ルートキープ