

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称 : (導入1週目)ア-ビ[®]タックス+トポ[®]テシ[®] 1外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
06	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ [®] 10mL 「ホツカ」 療法名:(導入1週目)ア-ビ [®] タックス+トポ [®] テシ [®] 1外科 フラッシュ:	10mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	ア-ビ [®] タックス投与30分前に投与
03	投与速度10mg/分以下 全量500mLに調製

インターバル日数： 42 日

基準日： Day 1

印刷日時： 2020-06-04 14:11:12

最大クール数：0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称：(導入2週目以降)アビタックス+トポテン 1外科

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アビタックス投与30分前に投与
03	投与速度10mg/分以下 全量250mLに調製
04	投与前フラッシュ用
05	投与後フラッシュ用
06	アビタックス投与30分前に投与

第一外科 【CV】

レジメン名称：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43							
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 中心静脈注射： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：CVルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	中心静脈注射	ホ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ ア`ロキシ静注0.75mg 5mL 生理食塩液 50mL プ`ラホ`トル 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 中心静脈注射： *点滴時間 5分で 投与経路：CVサブルート1	5mg 6.6mg 1V 50mL									
03	中心静脈注射	(化)ア-ビ`タックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プ`ラホ`トル 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 中心静脈注射： *点滴時間 1時間で 投与経路：CVサブルート1	0mg 250mL		投与順 3							
04	中心静脈注射	(化)トホ`テシ点滴静注※ 大塚糖液 5% 250mL プ`ラホ`トル 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 中心静脈注射： *点滴時間 90分で 投与経路：CVサブルート1	0mg 250mL									
05	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ 10mL 「ホ`ツカ」 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 フラッシュ：	10mL		1回							
06	フラッシュ	ロック用 生食注シリンジ 10mL 「ホ`ツカ」 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 フラッシュ：	10mL		1回							
07	中心静脈注射	ホ`ラミン注 5mg 1ml デ`キサト注射液(デ`カト`ロン後発)※ 生理食塩液 50mL プ`ラホ`トル 療法名：(8週目以降)ア-ビ`タックス+トホ`テシ 1外科 中心静脈注射： *点滴時間 5分で 投与経路：CVサブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2							

インターバル日数： 49 日

基準日： Day 1

印刷日時： 2020-06-04 14:12:19

最大クール数：0クール

第一外科 【CV】

レジメン名称：(8週目以降)アビタックス+トポテシ 1外科

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アビタックス投与30分前に投与
03	投与速度10mg/分以下 全量250mLに調製
05	投与前フラッシュ用
06	投与後フラッシュ用
07	アビタックス投与30分前に投与