

第一外科 【CV】

レジメン名称 : ベクテビックス単剤

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/2ポンプ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)ベクテビックス点滴静注100mg 5mL	6mg/kg		6.3mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:ベクテビックス単剤 中心静脈注射: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	中心静脈注射	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ベクテビックス単剤 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	6.6mg 5mg 100mL		投与順 2							
03	中心静脈注射	(化)ベクテビックス点滴静注100mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ベクテビックス単剤 中心静脈注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:CVサブルート1 フィルターを通す	0mg 100mL		投与順 3							
04	フラッシュ	ロック用 生食注射液 10mL 「オーツカ」 療法名:ベクテビックス単剤 フラッシュ:	10mL		2回							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	全量100mL 0.2or0.22 μ mのフィルター使用 ※1回1000mgを超える場合は添書参照