

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科

レジメン名称 : GEM 2 投 1 休 (末梢) 1 外科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: GEM 2 投 1 休 (末梢) 1 外科 点滴静注: *点滴時間 1時間 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液 (デキストロン後発) ※ ボラミン注 5mg 1ml カスター注射液 20mg 2mL ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg 「EMEC」 2mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: GEM 2 投 1 休 (末梢) 1 外科 点滴静注: *点滴時間 5分 投与経路: 末梢サブルート1 全開で滴下	6.6mg 5mg 20mg 0.3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化) ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 ※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: GEM 2 投 1 休 (末梢) 1 外科 点滴静注: *点滴時間 30分 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	ジエムサル投与30分前に