

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科

レジメン名称 : 胆道癌 GC療法

レジメン説明 : 2015移行により生成
2019/8/7 医師よりプロイマントの追加依頼あり修正 (Dex : 3.3mgへ)

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|------------------------|-----------|-----|------------|
| 04 | 点滴静注 | (化)シプロラチン点滴静注「マルコ」※ | 25mg/m2 | | 26.25mg/m2 |
| 06 | 点滴静注 | (化)ゲムシタビソン点滴静注用「ヤクルト」※ | 1000mg/m2 | | 1050mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|------|---|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | プロイマント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 150mg 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | アロキソ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg 3.3mg 100mL | | 投与順 3 | | | | | | |
| 04 | 点滴静注 | (化)シプロラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 500mL | | 投与順 4 | | | | | | |
| 05 | 点滴静注 | 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で <次ページあり> | 500mL | | 投与順 5 | | | | | | |

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科

レジメン名称 : 胆道癌 GC療法

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day8 | | | | | | |
|----|------|---|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 150mg 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | アロキソ静注0.75mg 5mL デキスト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg 3.3mg 100mL | | 投与順 3 | | | | | | |
| 04 | 点滴静注 | (化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 500mL | | 投与順 4 | | | | | | |
| 05 | 点滴静注 | 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | 投与順 5 | | | | | | |
| 06 | 点滴静注 | (化)ゲムタビン点滴静注用「ヤクルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胆道癌 GC療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 100mL | | 投与順 6 | | | | | | |

RP オーダーコメント

01 ルートキープ