

第一外科 【dose-dense】 レジメン名称 : dd EC

レジメン説明 : 2018/10/2承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                   | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値       |
|----|------|------------------------|----------|-----|-----------|
| 04 | 点滴静注 | (化)エビ`ル`シ`ン塩酸塩注射用「NK」※ | 90mg/m2  |     | 94.5mg/m2 |
| 05 | 点滴静注 | (化)注射用エト`キサン※          | 600mg/m2 |     | 630mg/m2  |

| RP       | 手技   | 薬剤名称   | 用量/単位                    | 処方1回量 | Day1  | Day2 | Day3 |  |  |  |  |  |
|----------|------|--|--------------------------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
| 01       | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:dd EC<br>点滴静注:<br>*点滴時間 2時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 100mL                    |       | 投与順 1 |      |      |  |  |  |  |  |
| 02       | 点滴静注 | プロイマ`ト`点滴静注用150mg<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:dd EC<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1                             | 150mg<br>100mL           |       | 投与順 2 |      |      |  |  |  |  |  |
| 03       | 点滴静注 | アロキシ`静注0.75mg 5mL<br>デ`キサー`ト`注射液(デ`カト`ロ`ン後発)※<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:dd EC<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg<br>6.6mg<br>100mL |       | 投与順 3 |      |      |  |  |  |  |  |
| 04       | 点滴静注 | (化)エビ`ル`シ`ン塩酸塩注射用「NK」※<br>生理食塩液 50mL プラボ`トル<br>療法名:dd EC<br>点滴静注:<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢サブルート1                       | 0mg<br>50mL              |       | 投与順 4 |      |      |  |  |  |  |  |
| 05       | 点滴静注 | (化)注射用エト`キサン※<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:dd EC<br>点滴静注:<br>*点滴時間 15分で  | 0mg<br>100mL             |       | 投与順 5 |      |      |  |  |  |  |  |
| <次ページあり> |      |  |                          |       |       |      |      |  |  |  |  |  |

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【dose-dense】

レジメン名称 : dd EC

| RP | 手技   | 薬剤名称                                      | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 |  |  |  |  |
|----|------|---|-------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
|    |      | 投与経路:末梢サブルート1                             |       |       |      |      |      |  |  |  |  |
| 06 | 皮下注射 | ジ-ラス皮下注3.6mg 0.36mL<br>療法名:dd EC<br>皮下注射: | 3.6mg |       |      |      | 1回   |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント                 |
|----|--------------------------|
| 01 | ルートキープ                   |
| 06 | 抗がん薬投与終了から24時間以上間隔を空けて使用 |