

第一外科 【dose-dense】 レジメン名称： dd PTX

レジメン説明：2018/10/2承認

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	175mg/m2		183.75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：dd PTX 点滴静注： *点滴時間 4時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名：dd PTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 3mg		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名：dd PTX 点滴静注： *点滴時間 3時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	皮下注射	ジ-ラスタ皮下注3.6mg 0.36mL 療法名：dd PTX 皮下注射：	3.6mg				1回				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用