

第一外科 【FEC・EC】 レジメン名称 : FEC75

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018/7/17 CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤 :

| RP | 手技   | 薬剤名称   | 標準値(1回量)             | 標準値 | 上限値                    |
|----|------|--|----------------------|-----|------------------------|
| 04 | 点滴静注 | (化)エピル <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 塩酸塩注射用「NK」※ | 75mg/m <sup>2</sup>  |     | 78.75mg/m <sup>2</sup> |
| 05 | 点滴静注 | (化)注射用エンドキサン※                                  | 500mg/m <sup>2</sup> |     | 525mg/m <sup>2</sup>   |
| 06 | 点滴静注 | (化)5-FU注※                                      | 500mg/m <sup>2</sup> |     | 525mg/m <sup>2</sup>   |

| RP | 手技       | 薬剤名称  | 用量/単位                    | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注     | 生理食塩液 250mL プラボ <sup>®</sup> トル<br>療法名:FEC75<br>点滴静注:<br>*点滴時間 120分で<br>投与経路:末梢ルートメイン1  | 250mL                    |       | 投与順 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴静注     | プロイ <sup>®</sup> ント <sup>®</sup> 点滴静注用150mg<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:FEC75<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1  | 150mg<br>100mL           |       | 投与順 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴静注     | デキ <sup>®</sup> サ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 注射液(デカ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 後発)※<br>アロキ <sup>®</sup> 静注0.75mg 5mL<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:FEC75<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 9.9mg<br>0.75mg<br>100mL |       | 投与順 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 点滴静注     | (化)エピル <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 塩酸塩注射用「NK」※<br>生理食塩液 50mL プラボ <sup>®</sup> トル<br>療法名:FEC75<br>点滴静注:<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢サブルート1   | 0mg<br>50mL              |       | 投与順 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 点滴静注     | (化)注射用エンドキサン※<br>生理食塩液 250mL プラボ <sup>®</sup> トル<br>療法名:FEC75   | 0mg<br>250mL             |       | 投与順 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | <次ページあり> |   |                          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一外科 【FEC・EC】

レジメン名称 : FEC75

| RP | 手技   | 薬剤名称   | 用量/単位       | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|--|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|    |      | 点滴静注:<br>*点滴時間 1時間で<br>投与経路:末梢サブルート1   |             |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 点滴静注 | (化)5-FU注※<br>生理食塩液 50mL プラボトル<br>療法名:FEC75<br>点滴静注:<br>*点滴時間 15分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 0mg<br>50mL |       | 投与順 6 |  |  |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント |
|----|----------|
| 01 | ルートキープ   |