

第一外科 【GEM】 レジメン名称 : GEM+wPTX

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2018/7/17CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正
 2019/9/26 サンタック→カスターへ変更

適用条件 :
 除外条件 :
 体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184
 AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	175mg/m2		184mg/m2
04	点滴静注	(化)ゲムシタピリン点滴静注用「ヤルト」※	1250mg/m2		1313mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 3mg		投与順 2						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ゲムシタピリン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	6.6mg 3mg								

第一外科 【GEM】

レジメン名称 : GEM+wPTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1mL ガスター注射液20mg 2mL グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 3mg								
03	点滴静注	(化)パクリキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
04	点滴静注	(化)ゲムシタヒン点滴静注用「ヤルト」※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
05	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:GEM+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルターを使用