

第一外科 【タキサン単独】 レジメン名称 : wPTX(x1)

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/17CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハ ^ク リタキセル点滴静注液※	80mg/m ²		84mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プ ^ラ ボ ^ト ル 療法名:wPTX(x1) 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デ ^キ サ ^ト 注射液(デ ^カ ト ^ロ ン後発)※ ホ ^ラ ラ ^ミ ン注 5mg 1ml カ ^ス タ ^ー 注射液20mg 2mL グ ^ラ セ ^ト ロン点滴静注ハ ^ク ク ^ク 3mg/100mL「NK」 療法名:wPTX(x1) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 3mg		投与順 2						
03	点滴静注	大塚糖液 5% 250mL プ ^ラ ボ ^ト ル (化)ハ ^ク リタキセル点滴静注液※ 療法名:wPTX(x1) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	250mL 0mg		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.22μm以下のフィルター使用