

第一外科 【タキサン併用】 レジメン名称 : TC(cyc)

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23 DOC (アルコールフリー) へ変更
 2018/7/17 CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	75mg/m2		78.75mg/m2
04	点滴静注	(化)注射用エンドキサン※	600mg/m2		630mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:TC(cyc) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ グレーストン静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:TC(cyc) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:TC(cyc) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)注射用エンドキサン※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:TC(cyc) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ