

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称：初回(2日)Tmab+DTX

レジメン説明：2015移行により生成
2017/8/23 DOC (アルコールフリー) へ変更
2018/07/17CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		75mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：初回(2日)Tmab+DTX 点滴静注： *点滴時間 2時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1					
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名：初回(2日)Tmab+DTX 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	グレースロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキスト注射液(デキサメタゾン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml 療法名：初回(2日)Tmab+DTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg			投与順 2					
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名：初回(2日)Tmab+DTX 点滴静注： *点滴時間 60分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL			投与順 3					

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可