

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称：初回wTmab+wPTX

レジメン説明：2018/5/18 主科より初回レジメンが無いとの問い合わせあり、登録
2018/7/17CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式：男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式：男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	4mg/kg		4.2mg/kg
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：初回wTmab+wPTX 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名：初回wTmab+wPTX 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2								
03	点滴静注	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL 療法名：初回wTmab+wPTX 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 20mg		投与順 3								
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名：初回wTmab+wPTX 点滴静注： *点滴時間 60分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 初回wTmab+wPTX

RP	オーダーコメント
02	忍容性良ければ30分まで短縮可
04	0.22 μ m以下のフィルター使用

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 維持wTmab+wPTX

レジメン説明 : 2018/5/18 ルートキープを5%Tz→生食に修正
2018/7/17 CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		2.1mg/kg
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キット 療法名:維持wTmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:維持wTmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	グラセロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホファミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL 療法名:維持wTmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 20mg		投与順 3						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:維持wTmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 維持wTmab+wPTX

RP	オーダーコメント
02	忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可
04	0.22 μ m以下のフィルター使用