

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 初回TCH(CBDCA)

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23 DOC (アルコールフリー) へ変更
 2018/07/17CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	4mg/kg		4.2mg/kg
05	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	75mg/m ²		78.8mg/m ²
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg
07	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		2.1mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	プロイノト点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml グレネトロン点滴静注「ハック」3mg/100mL「NK」 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 3mg		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	0mg		投与順 5						

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称：初回TCH(CBDCA)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名：初回TCH(CBDCA) 点滴静注： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名：初回TCH(CBDCA) 点滴静注： *点滴時間 90分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名：初回TCH(CBDCA) 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	150mg 100mL								
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml グラネチロン点滴静注ハック 3mg/100mL「NK」 療法名：初回TCH(CBDCA) 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	8.25mg 5mg 3mg								
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名：初回TCH(CBDCA) 点滴静注： *点滴時間 60分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL								
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名：初回TCH(CBDCA) 点滴静注： *点滴時間 60分で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル	0mg 250mL		投与順 2						

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 初回TCH(CBDCA)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									
03	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL									
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 3mg									
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									
07	点滴静注 <次ページあり>	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル	0mg 250mL		投与順 2							

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【ハーセプチン+タ:レジメン名称 : 初回TCH(CBDCA)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		療法名:初回TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
07	忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 維持TCH(CBDCA)

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23 DOC (アルコールフリー) へ変更
 2018/07/17CVフラッシュ生食組み込みに伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※	2mg/kg		2.1mg/kg
05	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※	75mg/m ²		78.8mg/m ²
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:維持TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:維持TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	プロメト点注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:維持TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml グラネセロン点滴静注「ハック」3mg/100mL「NK」 療法名:維持TCH(CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 3mg		投与順 4						
05	点滴静注	(化)トセタキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL フラボトル	0mg 250mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 維持TCH (CBDCA)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:維持TCH (CBDCA) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	(化)ハーセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:維持TCH (CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2							
03	点滴静注	プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:維持TCH (CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL									
04	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ホフラン注 5mg 1ml グラセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:維持TCH (CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 5mg 3mg									
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:維持TCH (CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サド」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:維持TCH (CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【ハーセプチン+タレジメン名称 : 維持TCH(CBDCA)

RP	オーダーコメント
02	忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可