

第一外科 【カドサイラ】 レジメン名称 : T-DM1

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)カドサイラ点滴静注用※	3.6mg/kg		3.78mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:T-DM1 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	テキサト注射液(テカト後発)※ ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:T-DM1 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)カドサイラ点滴静注用※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:T-DM1 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22μmのフィルター使用 初回90分、忍容性良ければ2回目以降30分まで短縮可