

第一外科 【タキサン併用】 レジメン名称 : Bmab+wPTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: Bmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	デキサト注射液(デキソロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グレネトロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 療法名: Bmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	9.9mg 5mg 20mg 3mg		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アハスチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Bmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名: Bmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	忍容性良ければ、2回目60分、それ以降30分まで短縮可
04	0.22μm以下のフィルター使用