





インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【免疫チェックポイント阻害レジメン名称 : Atezolizumab + nab-PTX (PD-L1+, TNBC)

| RP | 手技   | 薬剤名称                                                                                                                         | 用量/単位        | 処方1回量 | Day15 |  |  |  |  |  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:Atezolizumab + nab-PTX (PD-L1+, TNBC)<br>点滴静注:<br>*点滴時間 2時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1                       | 100mL        |       | 投与順 1 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴静注 | ガラセトロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」<br>療法名:Atezolizumab + nab-PTX (PD-L1+, TNBC)<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1             | 3mg          |       | 投与順 2 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴静注 | (化)セントリク点滴静注840mg<br>生理食塩液 250mL プラボトル<br>療法名:Atezolizumab + nab-PTX (PD-L1+, TNBC)<br>点滴静注:<br>*点滴時間 60分で<br>投与経路:末梢サブルート1  | 0mg<br>250mL |       | 投与順 3 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 点滴静注 | (化)アプタキオン点滴静注用100mg<br>生理食塩液 50mL プラボトル<br>療法名:Atezolizumab + nab-PTX (PD-L1+, TNBC)<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 0mg<br>50mL  |       | 投与順 4 |  |  |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント                                       |
|----|------------------------------------------------|
| 01 | ルートキープ                                         |
| 03 | 0.2又は0.22µmのフィルター使用<br>忍容性が良ければ、2回目以降は30分まで短縮可 |
| 04 | フィルターを通さない                                     |