

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外

レジメン説明 : 2021/12/24承認

適用条件 : <かへシカヒン>

★2000mg/m2/日を1日2回に分けて服用

★2週投与→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

JP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプゾーホ点滴静注※	360mg		360mg
06	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルプラト後発)点滴静注液「NK」※	130mg/m2		136.5mg/m2

JP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	大塚糖液 5% 250mL ソフトパック 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	パロセトロン(アキシ後発)静注0.75mg/5mL「タイカ」 デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホラシン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 3.3mg 5mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプゾーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	大塚糖液 5% 100mL プラホトル 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外	100mL		投与順 5						

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : 胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1									
06	点滴静注	(化)オキサリプラチン(エルブラット後発)点滴静注液「NK」※ 大塚糖液 5% 250mL ソフトバッグ 療法名:胃癌 Nivolumab + CapeOX 1外 点滴静注: *点滴時間 120分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用
05	ルートキープ