

age: 1/9 期間: Day1~Day7

インターバル日数: 28日 基準日: Day 1

等一外科 【末梢】

レジメン名称: biweekly DCF療法

レジメン説明: 2021/1/8承認

2022/3/4 アキシ→パロセトロンへ変更

適用条件:

除外条件:

$$BSA \text{ 表面積計算式: } \text{男性用: } \text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184 \quad \text{女性用: } \text{体重(kg)}^{0.425} \times \text{身長(cm)}^{0.725} \times 0.007184$$

$$UC \text{ 計算式: } \text{男性用: } AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times CRE) + 25) \quad \text{女性用: } AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times CRE) + 25)$$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	30mg/m ²		31.5mg/m ²
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	80mg/m ²		84mg/m ²
11	点滴静注	(化)5-FU注※	800mg/m ²		840mg/m ²
14	点滴静注	(化)5-FU注※	800mg/m ²		840mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ガイノール輸液 500mL バック 療法名: biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL		投与順 2						
03	点滴静注	プロイド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	パロセトロン(アキシ後発)静注0.75mg/5mL「タイコ」 デキスト注射液(テカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: biweekly DCF療法 <次ページあり>	0mg 250mL		投与順 5						

外科 【末梢】

レジメン名称: biweekly DCF療法

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
1	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
12	点滴静注	サインD輸液 500mL パック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL								
13	点滴静注	プロピント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
14	点滴静注	パロセトロン(アキシ後発)静注0.75mg/5mL「タイオ」 テキート注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL								
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
06	点滴静注	ルデM1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テル」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL								
07	点滴静注	(化)シブリン点滴静注「マル」※ 生理食塩液 500mL ソフトパック「テル」	0mg 300mL								

<次ページあり>

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : biweekly DCF療法

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
02	点滴静注	ゲンシド輸液 500mL バック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL								
03	点滴静注	プロイント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
04	点滴静注	パロセトン(アロキ後発) 静注0.75mg/5mL 「タイカ」 デキスト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL								
05	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
06	点滴静注	カルデミ 輸液500mL KCL 注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL								
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」	0mg 300mL								
	<次ページあり>										

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : biweekly DCF療法

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1									
15	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	6.6mg 100mL								
16	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
17	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
18	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:biweekly DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了まで・残破棄可)
09	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
10	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
12	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
16	ルートキープ
17	ルートキープ