

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】

レジメン説明 : 2022/3/31承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m <sup>2</sup>		73.5mg/m <sup>2</sup>
10	点滴静注	(化)5-FU注※	350mg/m <sup>2</sup>		367.5mg/m <sup>2</sup>
11	点滴静注	(化)5-FU注※	350mg/m <sup>2</sup>		367.5mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ゲインD輸液 500mL パック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 2						
03	点滴静注	プロイント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	パロヒトン(アロキ後発) 静注0.75mg/5mL 「タイ秒」 デキサト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	カルテミ輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: <次ページあり>	500mL 10mL 8mL		投与順 5						

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 6						
07	静注(ワンショット)	フペミド <sup>®</sup> (リシックス後発)注20mg「武田チカ」2mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 静脈内注射(ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg		投与順 7						
08	点滴静注	ゲンD輸液 500mL バック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 8						
09	点滴静注	ルゲムA1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 9						
10	点滴静注	(化)5-FU注※ ルゲムA3A 輸液500mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順10	1回	1回	1回			
11	点滴静注	(化)5-FU注※ ルゲムA3A 輸液500mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順11	1回	1回	1回			
12	点滴静注 <次ページあり>	ルゲムA3A 輸液500mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】	500mL		投与順12						

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1									
13	点滴静注	カルテ M3A 輸液500mL 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			4回					
14	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	6.6mg 100mL			1回	1回	1回			
15	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:CDDP/5FU (FP) 【放射線併用】 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL				1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了までのメイン・残破棄可)
08	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
09	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
12	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
15	ルートキープ