

第一外科 【末梢】

レジメン名称: DCF療法

レジメン説明: 2021/1/8承認
 2021/11/22 5-FU供給不足のためフルオウラシル「ト-7」に変更
 2022/2/3 フルオウラシル「ト-7」在庫消化のため5-FUに変更

適用条件:

除外条件:

表面積計算式: 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

JC計算式: 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

IP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		73.5mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m2		73.5mg/m2
01	点滴静注	(化)5-FU注※	750mg/m2		787.5mg/m2
05	点滴静注	(化)5-FU注※	750mg/m2		787.5mg/m2

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ヲフパック 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1					
02	点滴静注	ゲインD輸液 500mL パック 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢サブルート1	500mL		投与順 2					
03	点滴静注	プロイムド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3					
04	点滴静注	パロレトン(アロキ後発) 静注0.75mg/5mL 「タイド」 デキサト注射液(デカト後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4					
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL ヲフパック	0mg 250mL		投与順 5					

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : DCF療法

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
		療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	ソルテ ^Δ I 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)シス ^ア チン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7						
08	静注(ワンショット)	フセミド [®] (テシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」2mL 療法名:DCF療法 静脈内注射(ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	1A		投与順 8						
09	点滴静注	ダ ^イ ンド輸液 500mL バック 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴速度 100mL/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 9						
10	点滴静注	ソルテ ^Δ I 輸液500mL K C L 注20mEqキット「テルモ」 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10						
11	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルテ ^Δ 3A 輸液500mL 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で	0mg 500mL		投与順11						
	<次ページあり>										

等一外科 【末梢】

レジメン名称 : DCF療法

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		投与経路:末梢サブルート1								
2	点滴静注	ゲンD輸液 500mL パック 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順12					
3	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			4回				
14	点滴静注	テキスト注射液(テクトン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	6.6mg 100mL			1回	1回	1回	1回	
15	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL			1回	1回	1回	1回	
16	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:DCF療法 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL				1回	1回	1回	1回

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了まで・残破棄可)
09	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
10	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
12	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
16	ルートキープ