

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP)

レジメン説明 : 2022/3/31承認

適用条件 :

除外条件 :

※表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	点滴静注	(化)キイトルダ [®] 点滴静注※	200mg		200mg
07	点滴静注	(化)シス [®] チン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		84mg/m2
11	点滴静注	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2
12	点滴静注	(化)5-FU注※	400mg/m2		420mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1					
02	点滴静注	ゲイノ [®] D輸液 500mL パック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 2					
03	点滴静注	アポイント [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 3					
04	点滴静注	パロセト [®] ン(アロキ [®] 後発)静注0.75mg/5mL「タイセイ」 デキスト [®] 注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 4					
05	点滴静注	(化)キイトルダ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラスト [®] ル 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: <次ページあり>	0mg 50mL		投与順 5					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1								
06	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 6					
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		投与順 7					
08	静注(ワンショット)	フオセト (ラシックス後発)注20mg「武田テバ」 2mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 静脈内注射 (ワンショット) : 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg		投与順 8					
09	点滴静注	ゲンシド輸液 500mL ハック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 9					
10	点滴静注	ソルテム1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順10					
11	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順11	1回	1回	1回	1回	
12	点滴静注 <次ページあり>	(化)5-FU注※	0mg		投与順12	1回	1回	1回	1回	

第一外科 【末梢】

レジメン名称 : Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		リテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL							
13	点滴静注	リテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順13					
14	点滴静注	リテム3A 輸液500mL 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			4回				
15	点滴静注	デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	6.6mg 100mL			1回	1回	1回	1回	
16	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Pembrolizumab + CDDP/5FU (FP) 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL				1回	1回	1回	1回

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ (シスプラチン投与終了までのメイン・残破棄可)
05	0.2~5μmのフィルター使用
09	シスプラチン投与終了後からのメイン 100ml/hで流す
10	シスプラチン投与終了後、すぐに開始
13	100ml/hで流す 日付が変わったら残破棄可
16	ルートキープ