

第一外科 【パージェタ】 レジメン名称 : 初回Pmab+Tmab+wPTX

レジメン説明 : 2022/2/21承認

常用条件 :

余外条件 :

本表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL	840mg		840mg
03	点滴静注	(化)ハセプチン注射用(添付希釈液なし)※	8mg/kg		8.4mg/kg
05	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)ハセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						
04	点滴静注	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 「HK」 デキスト注射液(デカロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 療法名:初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 20mg		投与順 4						
05	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:初回Pmab+Tmab+wPTX	0mg 250mL		投与順 5						
	<次ページあり>										





第一外科 【パージェタ】 レジメン名称 : 初回Pmab+Tmab+wPTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)パージェタ点滴静注420mg/14mL 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: 初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL								
03	点滴静注	(化)パセプチン注射用(添付希釈液なし)※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: 初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL								
04	点滴静注	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/100mL 「HK」 デキスト注射液(デキストン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL 療法名: 初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	3mg 6.6mg 5mg 20mg		投与順 2						
05	点滴静注	(化)パクリキセル点滴静注液※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: 初回Pmab+Tmab+wPTX 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	忍容性が良ければ2回目以降30分まで短縮可
03	忍容性が良ければ2回目以降30分まで短縮可
05	0.2μm以下のフィルター使用