

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab (Nivo : 2weekly)

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day29 | | | | | | |
|----|------|--|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab (Nivo : 2weekly) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | (化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab (Nivo : 2weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab (Nivo : 2weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 100mL | | | | | | | | |
| 04 | 点滴静注 | (化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab (Nivo : 2weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0mg 20mL | | | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|---|
| 01 | ルートキープ |
| 02 | 0.2又は0.22µmのフィルター使用 |
| 03 | オプジーボ投与後からヤーボイ開始までの30分間インターバル用 |
| 04 | 0.2~1.2µmのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること) |