

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

レジメン説明 : 2021/1/8承認

常用条件 :

除外条件 :

本表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※	360mg		360mg
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	1mg/kg		1.05mg/kg
07	点滴静注	(化)アリムタ注射用※	500mg/m ²		525mg/m ²
08	点滴静注	(化)カボプロチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイクト [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	パロセトロン(アロキ [®] 後発)静注0.75mg/5mL 「タイ秒」 デキスト [®] 注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注:	100mL		投与順 5						
	<次ページあり>										

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ヲフバツク 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL								
02	点滴静注	プロイント [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL								
03	点滴静注	パロセトン(アロキ [®] 後発)静注0.75mg/5mL 「タイカ」 デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL								
04	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL								
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
07	点滴静注	(化)アリム注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM	0mg 100mL								
	<次ページあり>										

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22								
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ツトパツタ 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1								
02	点滴静注	プロイット点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2								
03	点滴静注	パロリトロン(アキシ後発) 静注0.75mg/5mL 「タイカ」 デキサル注射液(アキシ後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)ワゾーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4								
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL										
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL										
07	点滴静注	(化)アリタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM	0mg 100mL		投与順 5								
	<次ページあり>												

age : 8/8 期間 : Day22~Day22

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

印刷日時 : 2022-05-26 10:40:45

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
		点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	(化)カボプロチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PEM 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用
05	オプジーボ投与後からヤホイ開始までの30分間インターバル用
06	0.2~1.2µmのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること)