

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX

レジメン説明 : 2021/1/8承認

適用条件 :

除外条件 :

本表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ <sup>®</sup> 点滴静注※	360mg		360mg
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	1mg/kg		1.05mg/kg
07	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※	200mg/m <sup>2</sup>		210mg/m <sup>2</sup>
08	点滴静注	(化)カボプ <sup>®</sup> ラチン点滴静注液「カト <sup>®</sup> 」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイメント <sup>®</sup> 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	パロセトロン(アロキ <sup>®</sup> 後発)静注0.75mg/5mL 「タイパ」 デキスト <sup>®</sup> 注射液(デカト <sup>®</sup> 後発)※ ガスター <sup>®</sup> 注射液20mg 2mL ボラミン注 5mg 1mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 20mg 5mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーボ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注 <次ページあり>	生食溶解液 100mL キットH	100mL		投与順 5						











呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称: Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ブイブイ点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	パロリトロン(アピキ後発)静注0.75mg/5mL 「タイド」 デキスト注射液(デキスト後発)※ カスター注射液20mg 2mL ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 20mg 5mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)オプジーホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
06	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL フラットル 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								
07	点滴静注 <次ページあり>	(化)パクリタセル点滴静注液※	0mg		投与順 5						

呼吸器内科【Ipi + Nivo + CTx】レジメン名称 : Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
		大塚糖液 5% 500mL ソフトバック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL								
08	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Ipilimumab + Nivolumab + CBDCA + PTX 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用
05	オプジーボ投与後からヤホイ開始までの30分間インターバル用
06	0.2~1.2µmのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること)
07	0.22µm以下のフィルター使用