







呼吸器内科

レジメン名称 : 中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo : 3weekly)

P	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22						
1	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo : 3weekly) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
2	点滴静注	(化)オプゾホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo : 3weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2						
3	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo : 3weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
4	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL フォボトル 療法名:中皮腫 Ipi + Nivo (Nivo : 3weekly) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22µmのフィルター使用
03	オプゾホ投与後からヤーボイ開始までの30分間インターバル用
04	0.2~1.2µmのフィルター使用 終濃度 : 1~4mg/mL (25kg未満は生食量を調整すること)