

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】レジメン名称 : Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内

レジメン説明 : 2021/7/16承認

適用条件 :

除外条件 :

体表積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	360mg		360mg
05	点滴静注	(化)アバフィン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg
06	点滴静注	(化)パクリタセル点滴静注液※	200mg/m2		210mg/m2
07	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソトパック 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1							
02	点滴静注	プロイソド点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2							
03	点滴静注	ボラシ注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL デキスト注射液(デキストン後発)※ パロセトン(アロキ後発)静注0.75mg/5mL「タイソ」 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 20mg 9.9mg 0.75mg 100mL		投与順 3							
04	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4							
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)アバフィン点滴静注用※	0mg		投与順 5							

呼吸器内科【Nivolumab + CTx】 レジメン名称 : Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内

IP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		生食溶解液 100mL キット 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL								
06	点滴静注	(化)パクリキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトパック 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 6						
07	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Nivo【360mg】+PTX+CBDCA+Bevacizumab 呼内 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 7						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用
05	忍容性良ければ、2回目60分、それ以降は30分まで短縮可
06	0.22µm以下のフィルター使用