

呼吸器内科

レジメン名称 : NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法

レジメン説明 : 2021/1/8 承認

適用条件 : タルセバ錠150mg 1日1回 連日内服

余外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※	10mg/kg		10.5mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	デキスト注射液(デカト [®] 後発)※ ホラニン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)サイラムサ [®] 点滴静注液※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:NSCLC ラムシルマブ + エルロチニブ 併用療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	<ul style="list-style-type: none"> ・ 0.2又は0.22µmのフィルターを通すこと ・ 全量250mL ・ 忍容性がよければ2回目以降30分まで短縮可