

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)アムタ+シス[°]ラチン療法(アレスミス注[°]ンビ[°]タン内服)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アムタ注射用※	500mg/m2		525mg/m2
06	点滴静注	(化)シス [°] ラチン点滴静注「マルコ」※	75mg/m2		80mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	ソルテ [°] ム3A 輸液500mL 療法名:後)アムタ+シス [°] ラチン療法(アレスミス注 [°] ンビ [°] タン内) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテ [°] ム3A 輸液500mL 療法名:後)アムタ+シス [°] ラチン療法(アレスミス注 [°] ンビ [°] タン内) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL テ [°] キート注射液(テ [°] カト [°] ン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)アムタ+シス [°] ラチン療法(アレスミス注 [°] ンビ [°] タン内) 点滴静注: *点滴時間 20分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 9.9mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)アムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)アムタ+シス [°] ラチン療法(アレスミス注 [°] ンビ [°] タン内) 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 100mL		投与順 4						
05	点滴静注	ソルテ [°] ム3A 輸液200mL 療法名:後)アムタ+シス [°] ラチン療法(アレスミス注 [°] ンビ [°] タン内) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 5						
06	点滴静注 <次ページあり>	(化)シス [°] ラチン点滴静注「マルコ」※	0mg		投与順 6						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : (後)アリムタ+シスプラチン療法 (フレスミンS注パンプビタン内服)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:(後)アリムタ+シスプラチン療法 (フレスミンS注パンプビタン内) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL								
07	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:(後)アリムタ+シスプラチン療法 (フレスミンS注パンプビタン内) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 7						
08	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:(後)アリムタ+シスプラチン療法 (フレスミンS注パンプビタン内) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 8						
09	点滴静注	テキサート注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:(後)アリムタ+シスプラチン療法 (フレスミンS注パンプビタン内) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL			1回	1回	1回			

RP	オーダーコメント
06	全量を500mlとする。 アリムタ投与後、30分を空けてCDDPを投与すること。