

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 間質性肺炎 エンドキサンプルス療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)注射用エトキシ※	500mg		500mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルゲム3A 輸液200mL 療法名:間質性肺炎 エンドキサンプルス療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)注射用エトキシ※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:間質性肺炎 エンドキサンプルス療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 2						