

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Durvalumab+CDDP+VP-16

レジメン説明 : 2020/9/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)イミフィジ <sup>®</sup> 点滴静注※	1500mg		1500mg
07	点滴静注	(化)エトボ <sup>®</sup> 点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」5mL	100mg/m2		105mg/m2
09	点滴静注	(化)シス <sup>®</sup> チン点滴静注「マルコ」※	80mg/m2		84mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトバ <sup>®</sup> ック 療法名:Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 10.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ソルテ <sup>®</sup> A1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 療法名:Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL		投与順 2						
03	点滴静注	ソルテ <sup>®</sup> A1 輸液500mL KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL 10mL 8mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)イミフィジ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生理食塩液 250mL ソフトバ <sup>®</sup> ック 療法名:Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注	プロイメント <sup>®</sup> 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: <次ページあり>	150mg 100mL		投与順 5						



インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Durvalumab+CDDP+VP-16

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
12	点滴静注	ソルテ <sup>®</sup> A3A 輸液500mL 療法名: Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 1	投与順 1				
13	点滴静注	テ <sup>®</sup> キート注射液(テ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL			投与順 2	投与順 2	1回			
14	点滴静注	ソルテ <sup>®</sup> A3A 輸液500mL 療法名: Durvalumab+CDDP+VP-16 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 4	投与順 4				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2~0.22 μmのフィルター使用 BW ≤ 30kgでは投与量 : 20mg/kg 終濃度 : 1~15mg/mL

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Durvalumab (CDDP/CBDCA, VP16) 維持 5コース以降

レジメン説明 : 2020/9/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)イミフィジ <sup>®</sup> 点滴静注※	1500mg		1500mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: Durvalumab (CDDP/CBDCA, VP16) 維持 5コース 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	(化)イミフィジ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: Durvalumab (CDDP/CBDCA, VP16) 維持 5コース 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22μmのフィルター使用 BW ≤ 30kgの投与量 : 20mg/kg 終濃度 : 1~15mg/mL