

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Durvalumab+CBDC+VP16

レジメン説明 : 2020/9/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)イフィゾ [®] 点滴静注※	1500mg		1500mg
05	点滴静注	(化)エボシ [®] 点滴静注液100mg「サト [®] 」5mL	80mg/m2		84mg/m2
06	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト [®] 」※	0mg		750mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Durvalumab+CBDC+VP16 点滴静注: *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	プロイマ [®] 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Durvalumab+CBDC+VP16 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	アロキ [®] 静注0.75mg 5mL デキスト [®] 注射液(デカ [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Durvalumab+CBDC+VP16 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 4.95mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)イフィゾ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 250mL ソフトパック 療法名:Durvalumab+CBDC+VP16 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)エボシ [®] 点滴静注液100mg「サト [®] 」5mL 大塚糖液 5% 500mL ソフトパック 療法名:Durvalumab+CBDC+VP16 点滴静注: <次ページあり>	0mg 500mL		投与順 5	投与順 3	投与順 3				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Durvalumab+CBDCA+VP16

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		*点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)カドプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名:Durvalumab+CBDCA+VP16 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 6						
07	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:Durvalumab+CBDCA+VP16 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			投与順 1	投与順 1				
08	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Durvalumab+CBDCA+VP16 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3.3mg 100mL			投与順 2	投与順 2				

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	0.2又は0.22µmのフィルター使用 BW≤30kgでは投与量:20mg/kg 終濃度:1~15mg/mL
07	ルートキープ

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : Durvalumab (CDDP/CBDCA, VP16) 維持 5コース以降

レジメン説明 : 2020/9/8承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)イミフィンジ [®] 点滴静注※	1500mg		1500mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: Durvalumab (CDDP/CBDCA, VP16) 維持 5コース以降 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)イミフィンジ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 250mL ソフトバック 療法名: Durvalumab (CDDP/CBDCA, VP16) 維持 5コース以降 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22µmのフィルター使用 BW ≤ 30kgの投与量 : 20mg/kg 終濃度 : 1~15mg/mL