

呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP+Weekly CPT-11

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/8/10 ウィーンバックに変更のため修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トボテン点滴静注※	60mg/m2		65mg/m2
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m2		65mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	グラセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トボテン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバック 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトバック「テルモ」 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 1L		投与順 4						
05	点滴静注	ウィーン輸液 500mL バック 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 2時間で <次ページあり>	500mL		投与順 5						

呼吸器内科

レジメン名称 : CDDP+Weekly CPT-11

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	リルテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1						
02	点滴静注	グラセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)トポテン点滴静注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液1000mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 1L								
05	点滴静注	ゲンF輸液 500mL バック 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		投与順 4						
06	点滴静注	リルテム3A 輸液500mL 療法名: CDDP+Weekly CPT-11 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL								

RP	オーダーコメント
02	アプレピタントの併用が推奨。day2、day3にデキサメタゾン8mgの投与が推奨。トポテシンの前に投与
04	CDDPの分は生食を捨てる