

共通

レジメン名称 : 後)AMR(day1, 2, 3)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)カルセト <sup>®</sup> 注射用20mg	40mg/m2		45mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	大塚糖液 5% 100mL プラボ <sup>®</sup> トル 療法名:後)AMR(day1, 2, 3) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1				
02	点滴静注	グラセトン静注液3mg「NK」 3mL デキサト <sup>®</sup> 注射液(デ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> トン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)AMR(day1, 2, 3) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 9.9mg 100mL		投与順 2	投与順 2	投与順 2				
03	点滴静注	(化)カルセト <sup>®</sup> 注射用20mg 生理食塩液 50mL プラボ <sup>®</sup> トル 療法名:後)AMR(day1, 2, 3) 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1 全開で滴下	0mg 50mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3				