

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : ハイカムチン療法 SCLC

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ハイカムチン注射用1.1mg	1mg/m ²		1.05mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:ハイカムチン療法 SCLC 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1		
02	点滴静注	ゲラセトロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカトロン後発)※ 療法名:ハイカムチン療法 SCLC 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 3.3mg		投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2		
03	点滴静注	(化)ハイカムチン注射用1.1mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ハイカムチン療法 SCLC 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3		

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	遮光