

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : PEM + CBDCA

レジメン説明 : 2015移行により生成
2020/07/08 プロイメント追加、デキサート半量に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|-----------------------|----------|-----|----------|
| 04 | 点滴静注 | (化)アリムタ注射用※ | 500mg/m2 | | 525mg/m2 |
| 05 | 点滴静注 | (化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ | 0mg | | 900mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | | | | | | |
|----|----------|---|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生食溶解液 100mL キットH 療法名: PEM + CBDCA 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路: 末梢ルートメイン1 | 100mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | プロイメント点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名: PEM + CBDCA 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1 | 150mg 100mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL デキサート注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: PEM + CBDCA 点滴静注: *点滴時間 20分で 投与経路: 末梢サブルート1 | 0.3mg 4.95mg 100mL | | 投与順 3 | | | | | | |
| 04 | 点滴静注 | (化)アリムタ注射用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: PEM + CBDCA 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路: 末梢サブルート1 | 0mg 100mL | | 投与順 4 | | | | | | |
| 05 | 点滴静注 | (化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名: PEM + CBDCA 点滴静注: | 0mg 500mL | | 投与順 5 | | | | | | |
| | <次ページあり> | | | | | | | | | | |

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

呼吸器内科

レジメン名称 : PEM + CBDCA

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | | | | | | |
|----|----|-------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢サブルート1 | | | | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|----------|
| 01 | ルートキープ |